

AKTUELLE PRODUKTER DENNE SESONGEN. FOR MER INFORMASJON, SE FELLESKATALOGTEKST.



Produktnavn	Rhinox	Rhinox	Zymelin	Zycomb	Solvipect	Noskapin	Granon
Reseptfri indikasjon	Rhinox® neseppray er et reseptfritt legemiddel som finnes i to styrker. 0,25 mg/ml for barn mellom 2-10 år, og 0,5 mg/ml som passer for voksne og barn over 10 år. Slimhinneavsvellende neseppray som brukes lokalt i nesen for å lette luftpassasjen ved tett nese ved forkjølelse og akutt bihulebetennelse. Til korttidsbehandling.	Rhinox® nesedråper er et reseptfritt legemiddel som finnes i tre ulike styrker. 0,25 mg/ml passer for barn mellom 2 og 10 år. 0,1 mg/ml passer for barn mellom 2-10 år. 0,5 mg/ml passer for voksne og barn over 10 år. Slimhinneavsvellende neseppray som brukes lokalt i nesen for å lette luftpassasjen ved tett nese ved forkjølelse. Til voksne og barn over 2 år brukes den også ved akutt bihulebetennelse. Eneste produkt for barn under 2 år. Til korttidsbehandling.	Zymelin® neseppray er et reseptfritt legemiddel som finnes i to ulike styrker. 0,5 mg/ml passer for barn mellom 2 og 10 år og 1,0 mg/ml passer for voksne og barn over 10 år. Brukes lokalt i nesen for å lette luftpassasjen ved tett nese ved forkjølelse og akutt bihulebetennelse. Til korttidsbehandling.	Zycomb® neseppray er et reseptfritt legemiddel til voksne over 18 år som både stopper rennende nese og åpner tett nese. Zycomb® brukes ved forkjølelse. Effekt oppnås vanligvis innen 15 minutter og varer i ca. 6 timer.	Solvipect® hostemikstur er et reseptfritt legemiddel som virker slimløsende ved hoste. Seigt slim blir mer tyntflytende, og er dermed lettere å hoste opp.	Noskapin® hostemikstur og tablett er et reseptfritt legemiddel som virker hostedempende ved tørrhoste og luftveisirritasjon.	Granon® brusetablett med sitronsmak er et reseptfritt legemiddel som virker slimløsende ved hoste. Seigt slim blir mer tyntflytende og er dermed lettere å hoste opp. Til korttidsbehandling.
Når	Ved tett nese ved forkjølelse og ved akutt bihulebetennelse.	Ved tett nese ved forkjølelse. Til voksne og barn over 2 år brukes den også ved akutt bihulebetennelse.	Ved tett nese ved forkjølelse og ved akutt bihulebetennelse.	Ved tett og rennende nese.	Ved slimhoste.	Ved tørrhoste og luftveisirritasjon.	Ved slimhoste.
Anbefalt døgndose	Rhinox 0,25 mg/ml – Barn 2-10 år: 1 spray i hvert nesebor opptil 3 ganger i døgnet. Rhinox 0,5 mg/ml – Voksne og barn over 10 år: 1 spray i hvert nesebor opptil 2-3 ganger i døgnet.	Rhinox 0,1 mg/ml: Nyfødte inntil 4 uker: 1 dråpe i hvert nesebor 15 min før måltid opptil 4 ganger i døgnet. Spedbarn 4 uker-1/2 år: 2 dråper i hvert nesebor 15 min før måltid opptil 4 ganger i døgnet. Barn 1/2-2 år: 1/2 endosebeholder (ca. 4 dråper) i hvert nesebor opptil 3 ganger i døgnet. Rhinox 0,25 mg/ml: Barn 2-10 år: 1/2 endosebeholder (ca. 4 dråper) i hvert nesebor opptil 3 ganger i døgnet. Rhinox 0,5 mg/ml: Voksne og barn over 10 år: 1/2 endosebeholder (ca. 3-5 dråper) i hvert nesebor opptil 2-3 ganger i døgnet.	Zymelin 0,5 mg/ml – Barn 2-10 år: 1 spray i hvert nesebor ved behov, opptil 3 ganger daglig. Zymelin 1,0 mg/ml – Voksne og barn over 10 år: 1 spray i hvert nesebor ved behov, opptil 3 ganger daglig.	18 år og oppover: 1 spray i hvert nesebor ved behov opptil 3 ganger daglig.	Barn 6-12 år: 10 ml 2-3 ganger daglig. Voksne og barn over 12 år: 10 ml 3-5 ganger daglig.	Barn 2-6 år: 5 ml 3 ganger daglig. Barn 6-10 år: 1/2 tablett (10 ml) 3 ganger daglig. Barn 10-14 år: 1/2 tablett (15 ml) 3 ganger daglig. Voksne og barn over 14 år: 1 tablett (20 ml) 3 ganger daglig.	Barn 6-18 år: 1 brusetablett 200 mg 2 ganger daglig. Voksne over 18 år: 1 brusetablett 200 mg 2-3 ganger daglig eller 1 brusetablett 600 mg 1 gang daglig.
Laveste doses aldersgrense	2 år	0 år	2 år	18 år	6 år	6 år	6 år
Viktig sikkerhetsinformasjon	Barn under 10 år: Bør ikke brukes mer enn 5 sammenhengende dager for å unngå medikamentell rhinitt ("rebound" effekt). Voksne og barn over 10 år: Bør ikke brukes mer enn 10 sammenhengende dager. Den anbefalte dosen må ikke overskrides. Ved uriktig bruk og høy dosering kan absorpsjon av oksymetazolin gi systemisk effekt, særlig hos barn. Styrkene 0,25 mg/ml og 0,5 mg/ml skal ikke brukes av barn <2 år. Skal ikke brukes ved betent nesetørhet.	Barn 2-10 år: Det bør gå minst 8 timer mellom hver dose. Skal ikke brukes sammenhengende i mer enn 5 dager. Voksne og barn over 10 år: Det bør gå minst 6 timer mellom hver dose. Skal ikke brukes sammenhengende i mer enn 10 dager. Skal ikke brukes av barn <2 år. Skal ikke brukes ved trangvinklet glaukom eller ved betennelsestilstander i hud og slimhinner i nesehulen.	Det bør gå minst 6 timer mellom hver dose. Zycomb skal ikke brukes sammenhengende i mer enn 7 dager. Skal ikke brukes av personer under 18 år. Skal ikke brukes ved grønn stær eller betent nesetørhet.	Skal ikke gis til barn under 6 år. Lege skal rådføres før bruk ved graviditet og amming. Inneholder sorbitol og etanol.	Bør ikke gis til barn under 2 år. Skal ikke brukes ved graviditet eller amming. Miksturen inneholder etanol.	Skal ikke gis til barn <2 år. Lege skal kontaktes dersom plagene er verre eller ikke er bedre etter 7 dager. Ved astma eller magesår skal Granon® kun brukes i samråd med lege. Bør ikke brukes ved graviditet og amming. Bør ikke brukes sammen med hostestillende midler. Inneholder natrium, laktose og sorbitol.	

